

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 257/2014d z dnia 22.07.2014 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 r. z dnia 18.02.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:

Scotts Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101A, 04 - 041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80;
fax. 22 465 61 91, e - mail: infopl@scotts.com

Producent:

Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde, BP 92, 69134 Ecully, Republika
Francuska

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

TARCZNIK ULTRA PR

Zawartość substancji czynnej:

acetamipryd - (insektycyd z grupy neonikotynoidów) – **4% (40 g/kg)**.

Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 z dnia 18.02.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 298/2011d z dnia 23.11.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 257/2014d z dnia 22.07.2014 r.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie pałeczek do bezpośredniego stosowania, o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania mszyc na begonii zimowej, mączlika szklarniowego na gerberze, misecznika cytrusowa na bluszczu i tarczniaka czerniaka na dracenie obrzeżnej występujących na roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

W roślinie działa układowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Begonia zimowa

mszyca ziemniaczana

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka

średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

Gerbera

mączlik szklarniowy

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka

średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

Bluszcz

misecznik cytrusowiec

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki:

średnica doniczki do 12 do 14 cm – 2 pałeczki

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

Dracena obrzeżna

tarcznik czerniak

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – 1 pałeczka na 1 litr podłoża Liczba zastosowanych pałeczek zależy od średnicy doniczki:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka

średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

Uwaga!

W przypadku dużej liczebności szkodnika objawy działania środka są widoczne od 5 tygodnia po zastosowaniu.

Pałeczki można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie ich intensywnego wzrostu lub po wystąpieniu szkodników, a także profilaktycznie w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.

Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.

Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są: w przypadku zwalczania mszyc po 1 dniach, mączlika szklarniowego po 17 dniach, miseczników po 21 dniach, tarczników po 28 dniach. Środek działa przez 5 do 10 tygodni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W przypadku uprawy bluszczu nie stosować środka do doniczek o średnicy mniejszej niż 12 cm z uwagi na możliwość występowania fitotoksyczności.
2. Środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.
3. Przed zastosowaniem środka w każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie gerbery należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -