

# ŚLIMAX<sup>04 GB</sup>

## Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Z.P.U.H „Best – Pest”  
Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.  
ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno,  
Tel: (0-32) 617 75 71, fax: (0-32) 615 00 07,  
e-mail: handel@bestpest.com.pl

## Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Środek ślimakobójczy o działaniu żołądkowym i kontaktowym, w formie przynęty granulowanej, przeznaczony do zwalczania ślimaków w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych oraz ozdobnych, a także w ogródkach działkowych i przydomowych. Środek wabi ślimaki i jest przez nie zjadany.

Zawartość substancji aktywnej:

**metaldehyd** -/ r-2, c-4, c-6, c-8-2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan/( związek z grupy pochodnych aldehydu) – 4%.

Zezwolenie MRiRW Nr 829/2001 z dnia 23.03.2001 r.,  
Zmienione decyzją MRiRW Nr R – 278/2003p z dnia 05.08.2003 r.  
oraz decyzją MRiRW Nr R-365/2007 z dnia 01.08.2007r.

## Uwaga!

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI rośliny rolnicze

### - rzepak ozimy, rzepak jary

Zalecana dawka: 4 g/10 m<sup>2</sup> (4 kg/ha)

Preparat rozsypać r ó w n o m i e r n i e na polu, np. aplikatorem do granulowanych środków chwastobójczych. Stosować po zauważeniu szkód wyrządzonych przez ślimaki. Stosować po siewie do fazy tworzenia się rozeł rzepaku.

### - rośliny kapustne, chrzan, sałata

Zalecana dawka: 5-8 g/10 m<sup>2</sup> (5-8 kg/ha), w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Stosować w razie potrzeby po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki. Środek rozsypać r ó w n o m i e r n i e w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać środkiem liści roślin uprawnych.

### - ogrody działkowe i przydomowe

Zalecana dawka: 5-8 g/10m<sup>2</sup> w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Stosować w razie potrzeby po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki. Środek rozsypać r ó w n o m i e r n i e w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać środkiem liści roślin uprawnych.

### - rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

Zalecana dawka: 5-8 g/10m<sup>2</sup> w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Stosować w razie potrzeby po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki. Środek rozsypać r ó w n o m i e r n i e w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów lub między roślinami w szklarni czy tunelu foliowym. Nie posypywać środkiem liści roślin uprawnych.

## UWAGI:

1. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz i podlewanie.
2. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczorem.

## OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczenia do konsumpcji):

Rzepak, rośliny kapustne, chrzan, sałata, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – **NIE DOTYCZY**

## OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

## PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

## WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednio rękawice ochronne.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

## UWAGA !

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

## PIERWSZA POMOC

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć czystą wodą utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut.

## ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

## Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 301 65 16

Kraków - (0-12) 411 99 99

Lublin - (0-81) 740 26 76

Łódź - (0-42) 657 99 00

Poznań - (0-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-17) 866 44 09

Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Warszawa - (0-22) 619 08 97

Wrocław - (0-71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Nr partii -

Zawartość netto -

na opakowaniu

